

Secundaire preventie bij bestaande of doorgemaakte Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS-I)

Deze patiënt lijdt aan CRPS aan de bovenste/onderste extremiteit (links/ rechts)*.

Het wordt afgeraden om een infuus in te brengen in de aangedane extremiteit.

Bij een operatie aan de aangedane extremiteit kan een recidief ontstaan.

Aanbevolen behandeling bij een operatie:

Secundaire preventie (bij bestaande of doorgemaakte CRPS I):

- wachten met operatie tot CRPS I verschijnselen verminderd zijn
- minimaliseer operatieduur en gebruik bloedleegte


Ter overweging:

- het gebruik van anesthesie met sympathicolytisch effect

Naam:

Uitgebreide informatie over evidence based richtlijn CRPS-I kunt u vinden op www.crps-vereniging.nl richtlijn versie behandelaars

* doorstrepen wat niet van toepassing is



Secondary prevention of existing or past Complex Regional Pain Syndrome (CRPS-I)

This patient is suffering from CRPS in the upper/lower extremity (left/right)*.

It is inadvisable to insert an IV into the affected extremity.

CRPS-I may recur when performing an operation on the affected extremity.

Recommended treatment in the event of an operation:

Secondary prevention (in existing or past CRPS I):

- wait until the CRPS I symptoms decrease before performing an operation
- minimise the duration of the operation and use a tourniquet

For consideration:

- Use anaesthesia with a sympathicolytic effect

Name:

You can find detailed information on the Evidence-Based (EBDG) CRPS-I Guidelines on.../Downloads/:/www.posttraumatischedystrofie.nl www.crps-vereniging.nl, select the version for medical practitioners.

* delete the inapplicable information

Sekundäre Prävention bei einem bestehenden oder zurückliegenden komplexen regionalen Schmerzsyndrom (CRPS-I)

Dieser Patient leidet an CRPS an der oberen/unteren Extremität (links / rechts)*.

Es wird davon abgeraten, in der betroffenen Extremität eine Infusion anzulegen.

Bei einer Operation an der betroffenen Extremität kann es zu einem Rückfall kommen.

Empfohlene Behandlung bei einer Operation:

Sekundäre Prävention (bei einem bestehenden oder zurückliegenden CRPS I):

- mit der Operation warten, bis die Symptome von CRPS I abgeschwächt sind
- die Operationsdauer minimieren und eine künstliche Blutleere anwenden

In Erwägung zu ziehen:

- der Einsatz von Anästhesie mit sympathikolytischer Wirkung

Name:

Ausführliche Informationen über die Evidence-Based-Richtlinie zu CRPS-I finden Sie auf der Site www.crps-vereniging.nl Richtlinienversion für behandelnde Fachkräfte



* Nichtzutreffendes streichen